

SKÓRY SUROWE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Skóry surowe zwierząt futerkowych Skóry królików dzikich	7713-04
		Grupa katalogowa 1585

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe z królików dzikich.

1.2. Symbol skóry z królika dzikiego: Kdz.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od jakości okrywy włosowej i mizdry rozróżnia się jedną kategorię, oznaczoną cyfrą arabską: 1.

2.2. Kategorie wad. W zależności od natężenia wad rozróżnia się w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry dwie kategorie wad, oznaczone literami: A, B.

2.3. Klasy skór. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad rozróżnia się dwie klasy skór futerkowych, oznaczone cyframi rzymskimi: I i II oraz dwie klasy skór filcowych, oznaczone cyframi: I i II.

2.4. Rodzaje. W zależności od przeznaczenia i jakości okrywy włosowej rozróżnia się dwa rodzaje skór:

F - futerkowe,

X - filcowe (nie nadające się do celów futrzarskich).

Skór silnie skreconych i zwiniętych nie zalicza się do skór futerkowych i filcowych.

2.5. Przykład oznaczenia skóry surowej z królika dzikiego pierwszej kategorii okrywy włosowej i mizdry, kategorii wad A, klasy pierwszej:

Kdz-1A I BN

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym z pozostawieniem przy niej skóry z głowy. Skóra z przednich kończyn powinna być odcięta w stawie nadgarstkowym, z tylnych - w stawie skokowym. Na skórze nie powinno być resztek mięśni, ścięgien, tłuszczu i skrzepów krwi. Skóra

powinna być wysuszona i odwrócona mizdra na zewnątrz.

3.2. Skóry futerkowe

3.2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad	
		A	B
		zakwalifikowanie skór po uwzględnieniu wad wg 3.2.2	
1	okrywa włosowa zimowa w pełni dojrzała, mizdra bez sinych plam, podszycie na stronie grzbietowej i na stronie brzusznej gęste, włosy pokrywowe wykształcone; dopuszcza się skóry z mniej wykształconą okrywą włosową na stronie brzusznej i bokach	1A	1B
Kategoria A oznacza wady niepoliczalne i jedną małą wadę policzalną.			
Kategoria B oznacza wady niepoliczalne oraz dwie wady małe lub jedną wadę średnią.			

3.2.2. Wady skór

Lp.	Grupy wad	Wyszczególnienie
1	Niepoliczalne	a) rozdarcia i rozcięcia skóry niezależnie od miejsca występowania mające do 1 cm długości, jeżeli występują w liczbie nie większej niż 2 b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów o łącznej powierzchni do 1 cm ² c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, krwią) do 4 cm ² d) wszelkie uszkodzenia skóry z głowy o łącznej powierzchni do 10 cm ² , całkowity brak kończyn oraz wycięcia skóry na podbrzuszu w kształcie trójkąta na długości do 5 cm e) nieznaczące pofałdowanie skóry f) zakonserwowanie skóry włosem na zewnątrz

Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
Ustanowiona przez Dyrektora CSWiS dnia 24 kwietnia 1968 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r.
(Mon. Pol. nr 27/1968 poz. 185)

cd. tablicy

Lp.	Grupy wad	Wyszczególnienie
2	Policzalne małe	a) rozdarcia i rozcięcia skóry o łącznej długości do 6 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów o powierzchni $2 \div 9 \text{ cm}^2$ c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni $5 \div 15 \text{ cm}^2$ d) wyraźne poprzeczne lub podłużne pofałdowanie skóry e) przesunięcie symetrii osi grzbietu do 5 cm f) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z podłużnym rozcięciem równo pośrodku brzucha (rozcięcie symetryczne) g) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów krwi na mizdrze w niewielkiej ilości h) wycięcie skóry na podbrzuszu w kształcie trójkąta na długości ponad 5 cm
3	Policzalne średnie	a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości $7 \div 19 \text{ cm}$ b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów o powierzchni $10 \div 19 \text{ cm}^2$ c) lekkie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry d) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni $16 \div 30 \text{ cm}^2$ e) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z niesymetrycznym rozcięciem wzdłuż linii brzucha f) zakonserwowanie skóry bez prawideł (skóry zniekształcone) g) resztki mięśni, tłuszczu i krwi na mizdrze w dużej ilości

3.2.3. Klasy skór

Klasy skór	Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad
I	1, 1A
II	1B

3.3. Skóry filcowe

3.3.1. Klasa I. Do klasy I skór filcowych zalicza się skóry niższej kategorii okrywy włosowej niż pierwsza ustalona dla skór futerkowych w 3.2.1, o powierzchni mniejszej niż 600 cm^2 , z uszkodzeniami przewyższającymi uszkodzenia policzalne przewidziane dla kategorii wad B.

3.3.2. Klasa II. Do klasy II skór filcowych zalicza się skóry źle zakonserwowane oraz uszkodzone przez szkodniki.

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie rodzaju,
- sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji,
- sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry,
- wykrywanie wad,
- sprawdzenie wielkości.

4.2. Badania rozjemcze. W sprawach spornych co do zakwalifikowania skóry do danej klasy służy odwołanie się do upoważnionego rzeczoznawcy, uzgodnionego przez obydwie strony, który wyda orzeczenie.

4.3. Opis badań

4.3.1. Sprawdzenie rodzaju, prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry oraz sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry należy przeprowadzić przez oględziny przy równomiernym oświetleniu.

4.3.2. Wykrywanie wad należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze, pod następującymi warunkami:

a) za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na uszkodzeniu, czyli powierzchnię wynikającą z pomnożenia największej szerokości przez największą długość uszkodzenia, mierzonych z dokładnością do 0,5 cm,

b) jeśli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną,

c) w przypadku występowania na powierzchni uszkodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń należy liczyć tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie,

d) powierzchnię skóry należy ustalić przez pomnożenie jej długości od międzyocza do nasady ogona przez średnią szerokość mierzoną pośrodku długości skóry, przy czym uzyskaną powierzchnię płaszczyzny grzbietowej należy pomnożyć przez 2.

4.3.3. Sprawdzenie wielkości wykonać przez zmierzenie długości skóry od międzyocza (a w przypadku braku łba - od górnej krawędzi skóry) do nasady ogona.

K O N I E C